吉豆與爪哇大豆種原圖說

Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations

行政院農業委員會農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電話：(04)2330-2301 傳真：(04)23338162

吉豆與爪哇大豆種原圖說 Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations 行政院農業委員會農業試驗所

農業試驗所特刊第199號

吉豆與爪哇大豆種原圖說

Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations

序言

聯合國糧食及農業組織 (Food and Agriculture Organization of the United Nations，FAO) 將西元2016年指定為國際豆類年 (International Year of Pulses 2016，IYP 2016)，這是聯合國自西元1957年以來，繼種子、稻米、馬鈴薯及藜粟後，第五次以農作物作為國際年的主題，其目的是希望藉由此一活動，呼籲世界各國重視各類乾豆對於人類、農業、土壤及農村經濟等方面的重要性。豆類作物營養豐富、種類繁多且用途廣泛，因此，國際豆類年是以「提供豐富營養、促進永續發展」為口號，將許多豆類作物納入推廣種植範圍，包括以乾燥或新鮮種子為食用部位的吉豆、紅豆、綠豆、豌豆、菜豆、長豇豆...，以及作為畜牧用飼料或綠肥的爪哇大豆、苜蓿或紫雲英。

吉豆 (Vigna mungo L.) 為豆科蝶形花亞科植物，原生於亞洲乾燥的熱帶氣候區，主要分布於巴基斯坦、緬甸和印度。吉豆種子煮熟後，可供人類日常食用，磨成粉末可以製作麵包，因其種皮有黑、灰、棕或暗綠等顏色，大小又與一般的綠豆相似，故又名黑吉豆或黑綠豆 (Black gram)。爪哇大豆 (Neonotonia wightii) 為豆科蝶形花亞科多年生藤蔓植物，在臺灣屬於外來歸化種，大多自生於國內中、南部海拔500公尺以下的山地或荒埔，故又名野生大豆，主要供作畜牧飼料或綠肥等用途。本所為響應國際豆類年的宣導主題，並為檢測低溫保存於中期庫10年以上的吉豆和爪哇大豆種子活力，以及強化生育性狀資料調查與影像收集，本年度與國立屏東科技大學合作，進行前述二種作物種原的更新和繁殖試驗。

本書將每個吉豆和爪哇大豆的品種 (系)，以一份特性調查表搭配植株、葉片、花朵、果莢與種子等外觀圖片，顯現種原的多樣性。這些圖文資料，也可以提供育種人員進行作物改良與研究之參考。本書能順利出版，係承蒙行政院農業委員會「種子庫暨種原資訊系統管理、種原離體保存與種子活力檢測」計畫〔105農科-9.7.1-農-C5(3)〕經費支持，特此申謝。

行政院農業委員會農業試驗所

所長 陳駿季

中華民國一〇五年十二月

編者按

本書收錄44種吉豆及35種爪哇大豆種原，並輔以450幀以上彩色圖片對照說明，因採用播種方式繁殖，故有數個品種(系)因遺傳質之差異，其種子外觀和種皮顏色出現不盡相同的情形，為維持原始提供單位之資料完整性和種原多樣性，故同一編碼之吉豆或爪哇大豆種原，即使種子出現不同種皮顏色，編者依舊保留完整圖片資料。書中另將各品種(系)發芽率和性狀調查表檢定標準等資料，列於書末附錄供讀者參閱和對照，特此說明。

本書在編輯期間雖已力求周延，惟內容疏漏之處在所難免，尚祈各界賢達及先進們不吝指正。本項試驗工作能順利完成，首先要感謝國立屏東科技大學農園生產系師生提供的設施和支援，本書在編撰期間也承蒙本組溫英杰組長，以及陳述博士、魏趨開技佐、蘇秀炫小姐、劉佳慧小姐等同仁的鼎力協助，在此一併致謝。

目錄 1

爪哇大豆

暫時碼	頁次
00A05215	1
00A05216	2
00A05217	3
00A05218	4
00A05219	5
00A05220	6
00A05221	7
00A05222	8
00A05223	9
00A05224	10
00A05225	11
00A05226	12
00A05227	13
00A05228	14
00A05229	15
00A05230	16
00A05231	17
00A05232	18
00A05233	19
00A05234	20
00A05235	21
99A00121	22

目錄 2

暫時碼	頁次
99A00122	23
99A00123	24
99A00124	25
99A00125	26
99A00126	27
99A00127	28
99A00128	29
99A00129	30
99A00130	31
99A00131	32
99A00132	33
99A00133	34
99A00134	35
05A01696	36
05A01717	37
05A01729	38
06A00680	39
06A00688	40
06A00689	41
06A00693	42
06A00701	43
06A00708	44

目錄 3

暫時碼 頁次

暫時碼	頁次
06A00712	45
06A00713	46
06A00714	47
06A00715	48
06A00724	49
06A00725	50
06A00727	51
06A00733	52
06A00735	53
06A00736	54
06A00738	55
06A00743	56
06A00744	57
06A00745	58
06A00746	59
06A00747	60
06A00754	61
06A00763	62
06A00773	63
06A00774	64
06A00801	65
06A00802	66

目錄 4

吉豆

暫時碼	頁次
06A00803	67
06A00835	68
06A00836	69
06A00843	70
06A00844	71
06A00847	72
06A00860	73
06A00861	74
06A00870	75
06A00891	76
06A00897	77
06A00898	78
06A00902	79
附錄一	80~81
附錄二	82
附錄三	83~93

暫時碼

00A05215

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)菱形 □(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：■(1)淡褐 □(2)褐 □(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 ■(2)扁圓 □(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 ■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 ■(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05216

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 ■(2)扁圓 □(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 ■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃　■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易　■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05217

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限
■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：■(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■□(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 ■(2)褐 □(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 ■(2)扁圓 □(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐
■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐
□(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05218

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限
■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 (3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高□(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 (5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐
□(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：■(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐
□(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05219

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 □(2)白 ■(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：■(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 ■(2)低 □(3)中 □(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 ■(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 ■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：■(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：■(1)黃 □(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05220

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 □(2)白 ■(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 ■(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 ■(2)扁圓 □(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 ■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 □(2)中 ■(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱



暫時碼

00A05221

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：
1.株型：□(1)有限 ■(2)半有限 □(3)半無限 □(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 □(2)白 ■(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)菱形 □(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 ■(2)褐 □(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 ■(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 □(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 □(3)中 ■(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05222

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 ■(2)低 □(3)中 □(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 ■(2)早 □(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 ■(2)褐 □(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 ■(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 ■(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱



暫時碼

00A05223



爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限
■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 □(2)綠 ■(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 ■(2)褐 □(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 ■(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐
□(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐
□(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05224

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 ■(2)疏 □(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 □(2)直 ■(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 ■(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 □(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱



暫時碼

00A05225

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限
■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 ■(2)疏 □(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 □(2)直 ■(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐
■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐
□(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05226



爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：

1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖

2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 ■(2)疏 □(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 □(2)直 ■(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉

10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)菱形 □(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花

12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子

20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 □(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：■(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他

27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05227

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限
■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 ■(2)扁圓 □(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐
■(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐
□(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 ■(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05228

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 ■(2)疏 □(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 (3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 ■(2)低 □(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：■(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：■(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 ■(2)褐 □(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 □(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05229

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限
■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 ■(2)低 □(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 ■(2)褐 □(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐
□(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐
□(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：■(1)黃 □(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 ■(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05230



爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限
■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 ■(2)疏 □(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 □(2)直 ■(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 ■(2)低 □(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐
■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 ■(5)褐 □(6)暗褐
□(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05231

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 ■(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 ■(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 □(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白■(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 ■(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05232

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 □(2)直 ■(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 ■(2)低 □(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)菱形 □(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 ■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 ■(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 □(2)中 ■(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 □(3)中 ■(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05233

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)



品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 ■(2)低 □(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 □(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 □(3)中 ■(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05234

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 ■(3)半無限 □(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：□(1)白 ■(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 ■(2)褐 □(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓■(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 □(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：■(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 ■(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

00A05235



爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限
■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 □(2)直 ■(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 ■(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 ■(2)褐 □(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐
□(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐
□(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 □(3)中 ■(4)強 □(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

暫時碼

99A00121

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 ■(3)半無限 □(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 □(2)白 ■(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 (3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：■(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 ■(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 ■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 □(3)中 ■(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

暫時碼

99A00122

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 ■(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 ■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 □(2)中 ■(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 ■(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

暫時碼

99A00123

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 ■(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 □(2)綠 ■(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 ■(2)早 □(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 ■(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：■(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：■(1)黃 □(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 ■(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

暫時碼

99A00124



爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限
■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 ■(2)疏 □(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：■(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：■(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：■(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：■(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多■(5)極多
17.乾莢成熟期：■(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐
□(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 ■(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐
□(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

99A00125

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：☐(1)有限 ☐(2)半有限 ☐(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 ☐(2)紫
3.主莖茸毛色澤：☐(1)無 ■(2)白 ☐(3)褐
4.主莖茸毛多少：☐(1)無 ☐(2)疏 ☐(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：☐(1)無 ■(2)直 ☐(3)扁
6.主莖高度：☐(1)極低 ☐(2)低 ☐(3)中 ☐(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：☐(1)極少 ☐(2)少 ☐(3)中 ☐(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：☐(1)極少 ☐(2)少 ■(3)中 ☐(4)多 ☐(5)極多
9.結莢高度：☐(1)極低 ■(2)低 ☐(3)中 ☐(4)高 ☐(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 ☐(2)5枚葉 ☐(3)7枚葉
11.小葉形狀：☐(1)披針形 ☐(2)菱形 ■(3)銳卵形 ☐(4)卵圓形

四、花
12.開花期：☐(1)極早 ☐(2)早 ☐(3)中 ■(4)晚 ☐(5)極晚
13.花色：■(1)白 ☐(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 ☐(2)綠 ☐(3)濃綠
15.單株總莢數：☐(1)極少 ■(2)少 ☐(3)中 ☐(4)多 ☐(5)極多
16.單莢粒數：☐(1)極少 ☐(2)少 ☐(3)中 ☐(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：☐(1)極早 ☐(2)早 ■(3)中 ☐(4)晚 ☐(5)極晚
18.乾莢色澤：☐(1)淡褐 ☐(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：☐(1)易 ☐(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 ☐(2)小 ☐(3)中 ☐(4)大 ☐(5)極大
21.種子形狀：☐(1)圓 ☐(2)扁圓 ☐(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：☐(1)黃白☐(2)黃 ☐(3)黃綠 ☐(4)綠 ■(5)淡褐 ☐(6)褐 ☐(7)暗褐 ☐(8)黑 ☐(9)複色
23.種臍色澤：■(1)白 ☐(2)黃 ☐(3)綠 ☐(4)淡褐 ☐(5)褐 ☐(6)暗褐 ☐(7)灰 ☐(8)黑
24.子葉色澤：☐(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：☐(1)弱 ■(2)中 ☐(3)強
26.種皮裂皮性：☐(1)易 ☐(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：☐(1)極弱 ☐(2)弱 ☐(3)中 ■(4)強 ☐(5)極強
28.抗病性：■(1)強 ☐(2)中 ☐(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 ☐(2)中 ☐(3)弱

暫時碼

99A00126

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 ■(2)扁圓 □(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 ■(3)黃綠 ■(4)綠 □(5)淡褐 □(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 ■(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 □(3)中 □(4)強 ■(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

暫時碼

99A00127

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 □(2)直 ■(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)菱形 □(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 ■(2)扁圓 □(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 □(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 ■(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：■(1)極弱 □(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱



暫時碼

99A00128

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 □(2)直 ■(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 ■(2)扁圓 □(3)橢圓 □(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 □(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：■(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限



二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 ■(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 □(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：■(1)黃 □(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 □(3)中 ■(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

暫時碼

99A00130

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高



三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)菱形 □(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 ■(6)褐 ■(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 ■(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

暫時碼

99A00131



爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 ■(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 □(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 ■(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱

暫時碼

99A00132

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 ■(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高
7.分枝數：■(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 ■(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 ■(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 ■(5)淡褐 □(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：■(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 □(3)中 ■(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱



暫時碼

99A00133

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 ■(2)白 □(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 ■(2)疏 □(3)中 □(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 □(2)直 ■(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 ■(3)中 □(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 □(3)中 □(4)高 ■(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 □(3)銳卵形 ■(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 ■(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：□(1)淡綠 □(2)綠 ■(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 ■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：■(1)白 □(2)黃 □(3)綠 □(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 □(2)弱 ■(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱



暫時碼

99A00134



爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性

一、植株：
1.株型：□(1)有限 □(2)半有限 □(3)半無限 ■(4)無限

二、莖
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
3.主莖茸毛色澤：□(1)無 □(2)白 ■(3)褐
4.主莖茸毛多少：□(1)無 □(2)疏 □(3)中 ■(4)密
5.主莖茸毛形狀：□(1)無 ■(2)直 □(3)扁
6.主莖高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高
7.分枝數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
8.主莖節數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 ■(4)多 □(5)極多
9.結莢高度：□(1)極低 □(2)低 ■(3)中 □(4)高 □(5)極高

三、葉
10.小葉數：■(1)3枚葉 □(2)5枚葉 □(3)7枚葉
11.小葉形狀：□(1)披針形 □(2)菱形 ■(3)銳卵形 □(4)卵圓形

四、花
12.開花期：□(1)極早 □(2)早 □(3)中 ■(4)晚 □(5)極晚
13.花色：■(1)白 □(2)紫

五、鮮豆莢及乾豆莢
14.鮮莢色澤：■(1)淡綠 □(2)綠 □(3)濃綠
15.單株總莢數：□(1)極少 ■(2)少 □(3)中 □(4)多 □(5)極多
16.單莢粒數：□(1)極少 □(2)少 □(3)中 □(4)多 ■(5)極多
17.乾莢成熟期：■(1)極早 □(2)早 □(3)中 □(4)晚 □(5)極晚
18.乾莢色澤：□(1)淡褐 □(2)褐 ■(3)暗褐
19.裂莢性：□(1)易 □(2)中 ■(3)難

六、種子
20.種子大小：■(1)極小 □(2)小 □(3)中 □(4)大 □(5)極大
21.種子形狀：□(1)圓 □(2)扁圓 □(3)橢圓 ■(4)扁橢圓
22.種子色澤：□(1)黃白 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)淡褐 ■(6)褐 □(7)暗褐 □(8)黑 □(9)複色
23.種臍色澤：□(1)白 □(2)黃 □(3)綠 ■(4)淡褐 □(5)褐 □(6)暗褐 □(7)灰 □(8)黑
24.子葉色澤：□(1)黃 ■(2)綠
25.種皮光澤：■(1)弱 □(2)中 □(3)強
26.種皮裂皮性：□(1)易 ■(2)中 □(3)難

七、其他
27.倒伏抗性：□(1)極弱 ■(2)弱 □(3)中 □(4)強 □(5)極強
28.抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
29.抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱

05A01696

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 □(6)暗綠 □(7)褐 ■(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：■(1)低 □(2)中 □(3)高
3. 分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 ■(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：■(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 ■(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 ■(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 □(2)中 ■(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

05A01717

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 □(7)褐 ■(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：□(1)低 ■(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 ■(4)圓卵形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 ■(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 ■(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

05A01729

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 ■(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：□(1)低 ■(2)中 □(3)高
3. 分枝性：■(1)弱 □(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1~2 ■(3)2~3 □(4)3~4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 ■(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 □(3)頂部
2. 每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6~8 □(3)9~11 □(4)12~14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
3. 株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：



06A00680

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□(1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 ■(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：□(1)低 ■(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1~2 □(3)2~3 □(4)3~4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 □(2)綠 ■(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：■(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6~8 □(3)9~11 □(4)12~14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00688

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：□(1)粉質 ■(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 ■(5)綠
□(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
3.分枝性：□(1)弱 □(2)中 ■(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1~2 □(3)2~3 □(4)3~4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 □(2)綠及紫 □(3)紫綠 ■(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 ■(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 □(2)6~8 ■(3)9~11 □(4)12~14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：
約在10月27日始花
最後採收日為翌年1月13日，但此時仍有些豆莢未成熟。

暫時碼

06A00689

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 □(6)暗綠 ■(7)暗褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：□(1)低 ■(2)中 □(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 ■(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：□(1)黃 ■(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)4～6 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 □(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00693

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 □(6)暗綠
□(7)褐 ■(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2.下胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
3.分枝性：□(1)弱 □(2)中 ■(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 ■(3)菱形 □(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3.葉色：■(1)淺綠 □(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 ■(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00701

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
□(6)暗綠 □(7)褐 ■(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 ■(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 ■(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 □(3)褐 ■(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00708

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠 □(6)暗綠 ■(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 ■(2)中 □(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：■(1)<1 □(2)1～2 □(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形 □(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 □(2)綠 ■(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 ■(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：□(1)黃 ■(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14 □(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早□(2)中 ■(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 □(2)中 ■(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：

暫時碼

06A00712

吉豆 (Black Gram)

品種特性

一、種子
1.種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2.種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3.千粒種子重：□(1)輕 □(2)中 ■(3)重

二、子葉
1.上胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫
2.下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖
1. 主莖節數：□(1)少 ■(2)中 □(3)多
2. 株高：□(1)低 □(2)中 ■(3)高
3.分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片
1. 初生葉長寬比：□(1)<1 □(2)1～2 ■(3)2～3 □(4)3～4
2. 小葉形狀：■(1)披針形 □(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3.葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4.葉柄基部之顏色：□(1)綠 □(2)綠及紫□(3)紫綠 ■(4)紫

五、花
1.花朵旗瓣顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 ■(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2.花朵翼瓣顏色：■(1)黃 □(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果
1.著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 □(2)中部 ■(3)頂部
2.每株莢數：□(1)少 □(2)中 ■(3)多
3. 每莢種子數：■(1)5以下 □(2)6～8 □(3)9～11 □(4)12～14
□(5)14粒以上（5莢平均）
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5.播種至50%豆莢成熟日數：□(1)早 ■(2)中 □(3)晚
6.每株種子產量：□(1)低 □(2)中 ■(3)高

七、其他
1. 抗病性：□(1)強 □(2)中 ■(3)弱
2. 抗蟲性：■(1)強 □(2)中 □(3)弱
3株型：□(1)有限型 ■(2)無限型
4.其他需要補充之性狀：